

УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 517.977

На правах рукописи

Зайцев Василий Александрович

**СОГЛАСОВАННОСТЬ, ДОСТИЖИМОСТЬ И
УПРАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЛЯПУНОВА**

01.01.02 — дифференциальные уравнения

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Ижевск — 2000 г.

Работа выполнена на кафедре дифференциальных уравнений Удмуртского государственного университета.

Научный руководитель — доктор физико-математических наук, профессор Е. Л. Тонков

Официальные оппоненты — доктор физико-математических наук, профессор Н. Х. Розов
кандидат физико-математич. наук,
доцент П. М. Симонов

Ведущая организация — Институт математики НАН Беларуси

Защита состоится « » 2000 года в часов на заседании диссертационного совета К 064.47.01 при Удмуртском государственном университете по адресу: г. Ижевск, ул. Университетская, 1 (корп. 4), Математический факультет, ауд. 216.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Удмуртского государственного университета.

Автореферат разослан «.....» 2000 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета к.ф.-м.н., доцент Н. Н. Петров

Актуальность темы. Изучаемые в этой работе задачи можно рассматривать как естественное развитие основной тематики классической теории регулирования, состоящей в построении линейной обратной связи, стабилизирующей исходный объект. В классической постановке обычно изучаются стационарные объекты, поведение которых моделируется линейными дифференциальными уравнениями или системами линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами и тем самым вопрос сводится к перемещению в заданное множество (например, в левую полуплоскость) корней характеристического многочлена матрицы системы.

В другой терминологии эти задачи можно интерпретировать как задачи управления показателями Ляпунова. Это позволяет расширить класс изучаемых объектов, включив в него нестационарные системы дифференциальных уравнений. Таким образом, появляется возможность привлечения активно развивающейся теории показателей Ляпунова (существенный вклад в развитие которой в последние годы внесли Б. Ф. Былов, Р. Э. Виноград, Д. М. Гробман, В. М. Миллионщиков, Н. А. Изобов, М. И. Рахимбердиев, И. Н. Сергеев и др.) и абстрактной теории динамических систем к изучению чисто управлеченческих задач.

В более общей постановке задачи управления показателями можно изучать как задачи ляпуновской приводимости управляемых систем. Задачам управления показателями Ляпунова и вопросам ляпуновской приводимости управляемых систем посвящены работы П. Бруновского, Е. Л. Тонкова, Н.Х. Розова и М.И. Рахимбердиева, С. Н. Поповой, Е. К. Макарова, Д. М. Оленчикова, И. В. Гайшуна и др.

Рассмотрим систему

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u, \quad (t, x, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \quad (1)$$

с ограниченными и кусочно непрерывными на \mathbb{R} матрицами $A(\cdot)$ и $B(\cdot)$. Управление в системе (1) строится по принципу линейной обратной связи $u = U(t)x$. Это приводит к изучению замкнутой системы

$$\dot{x} = (A(t) + B(t)U(t))x. \quad (2)$$

Система (2) глобально приводима по Ляпунову, если для любой системы

$$\dot{y} = D(t)y \quad (3)$$

с ограниченной и кусочно непрерывной на \mathbb{R} матрицей $D(\cdot)$ существует кусочно непрерывное и ограниченное управление $U = U(\cdot)$, при котором система (2) асимптотически эквивалентна системе (3), т. е. существует преобразование Ляпунова $x = L(t)y$, связывающее эти системы.

В работе Е. К. Макарова и С. Н. Поповой¹ доказано, что если $n = 2$, система (1) равномерно вполне управляема и матрица $B(\cdot)$ равномерно непрерывна, то система (2) глобально приводима по Ляпунову. Для произвольного n этот вопрос пока остается открытым.

Цель работы — изучение задач управления (в локальной и глобальной постановке) показателями Ляпунова и вопросов ляпуновской приводимости билинейных управляемых систем и, в частности, линейных управляемых систем с наблюдателем.

Научная новизна. В работе введено понятие локальной достижимости билинейной управляемой системы, тесно связанное с методом поворотов В. М. Миллионщикова. Доказана теорема о локальной ляпуновской приводимости равномерно локально достижимой системы. Показано, что для рекуррентных систем свойства локальной достижимости и равномерной локальной достижимости эквивалентны. Для динамической системы сдвигов получен ряд утверждений о локальной управляемости показателей Ляпунова. Изучено свойство согласованности, введенное в работе С. Н. Поповой и Е. Л. Тонкова². Доказано, что в некритическом случае (нуль находится внутри множества значений допустимых управлений) из согласованности следует локальная достижимость. Получены различные критерии согласованности. Подробно исследованы стационарные согласованные системы. Получены необходимые и достаточные условия глобальной управляемости показателей Ляпунова для стационарной системы с неполной обратной связью. Доказана теорема о λ -приводимости нестационарной равномерно вполне управляемой системы. Сформулированы следствия о глобальной управляемости центральных и особых показателей. Доказана теорема о глобальной управляемости показателей Ляпунова систем с кусочно постоянными матрицами в случае $n = 2$ и описана идея доказательства этой теоремы для произвольного n .

Теоретическая и практическая ценность. Доказанная в работе теорема об управлении показателями Ляпунова стационарной системы с наблюдателем является обобщением классического результата теории регулирования о существовании линейной обратной связи, стабилизирующей систему. Подробно исследовано свойство согласованности. Решен вопрос о глобальной управляемости центральных и особых пока-

¹ Макаров Е. К., Попова С. Н. О глобальной управляемости полной совокупности ляпуновских инвариантов двумерных линейных систем // Дифференц. уравнения. – 1999. – Т. 35. – № 1. – С. 97–106.

² Попова С. Н., Тонков Е. Л. Управление показателями Ляпунова согласованных систем. I // Дифференц. уравнения. – 1994. – Т. 30. – № 10. – С. 1687–1696.

зателей системы (2) с ограниченными кусочно непрерывными матрицами. Некоторые идеи и методы, предложенные в работе (например, идеи, применяемые при доказательстве теоремы о глобальной управляемости показателей кусочно постоянных систем и др.) могут быть использованы при решении других задач, связанных с управлениемской тематикой.

Апробация работы. Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранты 97-01-00413, 99-01-00454) и конкурсным центром фундаментального естествознания (грант 97-0-1.9).

Результаты диссертации докладывались на заседаниях Ижевского городского семинара по дифференциальным уравнениям и теории управления в 1997–2000 годах, на международной конференции IFAC «Негладкие и разрывные задачи управления и оптимизации» (NDPCO-98, Челябинск, 1998 г.), на четвертой Российской университетско-академической научно-практической конференции (Ижевск, 1999 г.), на семинаре по качественной теории дифференциальных уравнений (кафедра дифференциальных уравнений механико-математического ф-та МГУ, Москва, 2000 г.).

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в шести работах.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, одиннадцати параграфов (нумерация параграфов сквозная) и списка литературы. Объем диссертации 102 страницы. Библиографический список содержит 64 наименования.

Краткое содержание работы

Во введении приводится обзор основных работ на эту тему, описывается общая постановка задачи и излагается краткое содержание работы по параграфам.

В первом параграфе диссертации введены основные определения и понятия, используемые в работе. В диссертации изучаются билинейная управляемая система

$$\dot{x} = A_0(f^t\omega)x + u_1A_1(f^t\omega)x + \dots + u_rA_r(f^t\omega)x, \quad (x, u) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^r \quad (4)$$

и линейная управляемая система с наблюдателем

$$\dot{x} = A(f^t\omega)x + B(f^t\omega)u, \quad y = C^*(f^t\omega)x, \quad (x, u, y) \in \mathbb{R}^{n+m+k}, \quad (5)$$

параметризованные при помощи топологической динамической системы (Ω, f^t) . В системе (5) управление формируется в виде $u = Vy$, где

матрица $V = V(t, \omega)$ управляющих параметров выбирается из некоторого фиксированного множества. Полученную в результате замкнутую систему

$$\dot{x} = (A(f^t\omega)x + B(f^t\omega)VC^*(f^t\omega))x \quad (6)$$

будем отождествлять с парой (\mathbb{A}, ω) , где $\mathbb{A} = (A, B, C) : \Omega \rightarrow M_{n,n+m+k}$ ($M_{n,m}$ — пространство матриц размерности $n \times m$, если $m = n$, то пишем M_n), а билинейную систему (4) отождествим с парой (\mathbb{B}, ω) , где $\mathbb{B} = (A_0, A_1, \dots, A_r) : \Omega \rightarrow M_{n,n(r+1)}$.

Всякую систему (6) можно записать в виде (4). Действительно, если $B(\omega) = (b_1(\omega), \dots, b_m(\omega))$, $C(\omega) = (c_1(\omega), \dots, c_k(\omega))$, $b_i(\omega), c_j(\omega) \in \mathbb{R}^n$, $V = \{v_{ij}\}$ ($i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, k$), то

$$B(\omega)VC^*(\omega) = v_{11}b_1(\omega)c_1^*(\omega) + v_{12}b_1(\omega)c_2^*(\omega) + \dots + v_{1k}b_1(\omega)c_k^*(\omega) + \dots + v_{m1}b_m(\omega)c_1^*(\omega) + \dots + v_{mk}b_m(\omega)c_k^*(\omega).$$

Поэтому, если положить $r \doteq mk$,

$$A_0(\omega) \doteq A(\omega), \quad A_1(\omega) \doteq b_1(\omega)c_1^*(\omega), \dots, \quad A_k(\omega) \doteq b_1(\omega)c_k^*(\omega), \dots, \\ A_{r-k+1}(\omega) \doteq b_m(\omega)c_1^*(\omega), \dots, \quad A_r(\omega) \doteq b_m(\omega)c_k^*(\omega),$$

то тем самым каждой системе (\mathbb{A}, ω) можно поставить в соответствие систему (\mathbb{B}, ω) . Здесь матричному управлению $V = \{v_{ij}\}$ отвечает векторное управление $u \doteq (u_1, \dots, u_r) = \text{vec } V$, где vec — операция, разворачивающая матрицу по строкам в вектор-столбец. Таким образом, система (4) имеет более общий вид по сравнению с системой (6), поэтому все утверждения первой главы (справедливые как для системы (\mathbb{A}, ω) , так и для системы (\mathbb{B}, ω)) сформулированы и доказаны только для системы (\mathbb{B}, ω) .

Пусть фиксированы произвольное множество $U \subset \mathbb{R}^r$ ($0 \in U$) и инвариантное относительно потока f^t множество $E \subset \Omega$. Совокупность \mathcal{U} ограниченных на $\mathbb{R} \times E$ функций $(t, \omega) \rightarrow u(t, \omega)$ со значениями в U называется **множеством допустимых управлений**, если функция $t \rightarrow u(t, \omega)$ измерима на \mathbb{R} при каждом $\omega \in E$. Через $X_u(t, s, \omega)$ обозначается матрица Коши системы (4) при $u = u(t, \omega)$, соответственно $X_0(t, s, \omega)$ — матрица Коши системы $\dot{x} = A_0(f^t\omega)x$. Пусть $\mathfrak{D}_\vartheta(\omega) \subset M_n$ — **множество достижимости** матричного уравнения, отвечающего уравнению (4), из точки $X(0) = I$ за время ϑ , когда $u(\cdot)$ пробегает множество \mathcal{U} .

Определение 1. Система (\mathbb{B}, ω_0) называется локально достичимой, если найдутся $\vartheta > 0$ и $\varepsilon > 0$ такие, что выполнено включение $\mathcal{B}_\varepsilon(I)X_0(\vartheta, 0, \omega_0) \subset \mathfrak{D}_\vartheta(\omega_0)$, где $\mathcal{B}_\varepsilon(I) \subset M_n$ — ε -окрестность единичной матрицы. Система (\mathbb{B}, ω_0) называется равномерно локально достичимой, если найдутся $\vartheta > 0$ и $\varepsilon > 0$ такие, что включение $\mathcal{B}_\varepsilon(I)X_0(\vartheta, 0, \omega) \subset \mathfrak{D}_\vartheta(\omega)$ выполнено для всех $\omega \in \bar{\gamma}(\omega_0)$, где $\bar{\gamma}(\omega_0)$ — замыкание траектории точки $\omega_0 \in \Omega$.

Непосредственно из определения 1 следует, что система (\mathbb{B}, ω_0) локально достичима тогда и только тогда, когда существуют $\vartheta > 0$, $\varepsilon > 0$ такие, что для любой матрицы $H \in \mathcal{B}_\varepsilon(I)$ найдется допустимое управление $u(t, \omega_0)$, $t \in \mathbb{R}$ такое, что

$$X_u(\vartheta, 0, \omega_0) = H X_0(\vartheta, 0, \omega_0), \quad (7)$$

и система (\mathbb{B}, ω_0) равномерно локально достижима в том и только том случае, если существуют $\vartheta > 0$ и $\varepsilon > 0$ такие, что для любой функции $H : \bar{\gamma}(\omega_0) \rightarrow \mathcal{B}_\varepsilon(I)$ найдется допустимое управление $u : \mathbb{R} \times \bar{\gamma}(\omega_0) \rightarrow U$, обеспечивающее для всех $\omega \in \bar{\gamma}(\omega_0)$ равенства $X_u(\vartheta, 0, \omega) = H(\omega)X_0(\vartheta, 0, \omega)$.

Свойство локальной достижимости тесно связано с методом поворотов В. М. Миллионщикова. Наличие свойства локальной достижимости предоставляет возможность (в силу (7)) «немного поворачивать» матрицу Коши системы (4) с помощью подходящего управления и тем самым локально влиять на поведение решений (если бы мы могли обеспечить равенство (7) для любой матрицы H с $\det H > 0$, то мы могли бы глобально влиять на поведение решений). Не всякая система обладает этим свойством, но очевидно, что система $\dot{x} = A(t)x + V(t)x$, где матрица $A(t)$ ограничена, а элементы матрицы $V(t)$ интерпретируются как управляющие функции ($|V(t)| \leq \varepsilon$), равномерно локально достижима. Таким образом, выполнено (7), и это обстоятельство позволило В. М. Миллионщикову³, а вслед за ним и другим исследователям⁴ построить современную теорию показателей Ляпунова.

³ Милионщиков В. М. Критерий малого изменения направлений решений линейной системы дифференциальных уравнений при малых возмущениях коэффициентов системы // Матем. заметки. — 1968. — Т. 4. — № 2. — С. 173–180.

Милионщиков В. М. Грубые свойства линейных систем дифференциальных уравнений // Дифференц. уравнения. — 1969. — Т. 5. — № 10. — С. 1775–1784.

Милионщиков В. М. Доказательство достижимости центральных показателей линейных систем // Сиб. матем. журнал. — 1969. — Т. 10. — № 1. — С. 99–104.

⁴ Изобов Н. А. Линейные системы дифференциальных уравнений // Итоги науки и техн. ВИНИТИ. Матем. анализ. — 1974. — Т. 12. — С. 71–146.

Определение 2. Система (\mathbb{B}, ω_0) обладает свойством локальной управляемости показателей Ляпунова, если существует $\delta > 0$ такое, что для любого вектора $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)$, $|\mu| \leq \delta$ найдется допустимое управление $u_\mu(t, \omega_0)$, определенное на \mathbb{R} , которое обеспечивает равенства $\lambda_i(\mathbb{B}, \omega_0, u_\mu) = \lambda_i(\mathbb{B}, \omega_0, 0) + \mu_i$, $i = 1, \dots, n$, где $\lambda_i(\mathbb{B}, \omega_0, u_\mu)$ — показатели Ляпунова системы (\mathbb{B}, ω_0) при управлении $u = u_\mu(t, \omega_0)$.

Во втором параграфе изучаются свойства достижимых систем. Предполагается, что U — выпуклый компакт. Доказано, что в случае, когда Ω — минимальное множество, свойства локальной достижимости и равномерной локальной достижимости эквивалентны.

В третьем параграфе доказано одно из основных утверждений работы — теорема о локальной ляпуновской приводимости, т. е. о приводимости к системе близкой к невозмущенной.

Теорема 1. Пусть система (\mathbb{B}, ω_0) равномерно локально достижима. Тогда существует $\delta > 0$ такое, что для любой матрицы $P : \bar{\gamma}(\omega_0) \rightarrow \mathcal{B}_\delta(0) \subset M_n$ найдется допустимое управление $\hat{u} : \mathbb{R} \times \bar{\gamma}(\omega_0) \rightarrow U$, при котором система

$$\dot{x} = (A_0(f^t \omega) + \hat{u}_1(t, \omega)A_1(f^t \omega) + \dots + \hat{u}_r(t, \omega)A_r(f^t \omega))x$$

приводима ляпуновским преобразованием $x = L(t, \omega)y$ к системе

$$\dot{y} = (A_0(f^t \omega) + P(f^t \omega))y.$$

В четвертом параграфе получены следствия из теоремы 1 о локальной управляемости показателей Ляпунова. Для системы

$$\dot{x} = (A_0(t) + u_1 A_1(t) + \dots + u_r A_r(t))x, \quad (t, x, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^r, \quad (8)$$

заданной функцией $\mathcal{A} = (A_0, A_1, \dots, A_r) : \mathbb{R} \rightarrow M_{n,n(r+1)}$, построим динамическую систему сдвигов $(\mathfrak{R}(\mathcal{A}), f^t)$. Доказаны следующие утверждения.

Теорема 2. Пусть система (8) равномерно локально достижима. Если система

$$\dot{x} = A_0(t)x \tag{9}$$

правильная или диагонализируемая (т. е. приводится ляпуновским преобразованием к диагональной системе), то система (8) обладает свойством локальной управляемости показателей Ляпунова.

Теорема 3. Пусть система (8) равномерно локально достижима. Если показатели системы (9) устойчивы, то система (8) обладает свойством локальной управляемости попарно различных показателей Ляпунова.

Теорема 4. Пусть функция $t \rightarrow \mathcal{A}(t)$ рекуррентна и система (8) локально достижима. Тогда существует такое $\delta > 0$, что для любого вектора $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathcal{O}_\delta^n(0)$ найдется допустимое управление $u^\mu : \mathbb{R} \rightarrow U$, при котором для почти всех $\tilde{\mathcal{A}} \in \mathfrak{R}(\mathcal{A})$ (относительно любой инвариантной вероятностной меры p на $\mathfrak{R}(\mathcal{A})$) система

$$\dot{x} = (\tilde{\mathcal{A}}_0(t) + u_1^\mu(t)\tilde{\mathcal{A}}_1(t) + \dots + u_r^\mu(t)\tilde{\mathcal{A}}_r(t))x \quad (10)$$

является правильной и ее показатели Ляпунова $\lambda_i(\tilde{\mathcal{A}}, u^\mu)$ удовлетворяют равенствам $\lambda_i(\tilde{\mathcal{A}}, u^\mu) = \lambda_i + \mu_i$, $i = 1, \dots, n$, где λ_i — показатели Ляпунова системы $\dot{x} = \tilde{\mathcal{A}}_0(t)x$.

Теорема 5. Пусть функция $t \rightarrow \mathcal{A}(t)$ почти периодическая по Бору, система (8) локально достижима и система $\dot{x} = A_0(t)x$ имеет совокупность из n отделенных решений. Тогда система (8) обладает свойством локальной управляемости показателей Ляпунова для всех $\tilde{\mathcal{A}} \in \mathfrak{R}(\mathcal{A})$ и всякая система (10) является правильной.

В пятом параграфе изучается свойство согласованности для систем (\mathbb{A}, ω) и (\mathbb{B}, ω) . Доказано, что в случае, когда $0 \in \text{int } U$, из согласованности (равномерной согласованности) следует локальная (соответственно равномерная локальная) достижимость. Показано, что обратное утверждение неверно.

В шестом параграфе получены различные критерии согласованности систем \mathbb{A} и \mathbb{B} для динамической системы сдвигов. Доказана теорема, которая иллюстрирует связь между свойством согласованности системы \mathbb{A} и свойствами управляемости и наблюдаемости⁵. Показано, что свойство согласованности эквивалентно свойству полной управляемости «большой системы»⁶. Получены необходимые и достаточные условия согласованности, выраженные в терминах невырожденности матричной краевой задачи и в терминах существования матрицы $V(t)$, удовлетворяющей некоторому дифференциальному неравенству⁷.

⁵Попова С. Н., Тонков Е. Л. Управление показателями Ляпунова согласованных систем. I // Дифференц. уравнения. – 1994. – Т. 30. – № 10. – С. 1687–1696.

⁶Попова С. Н., Тонков Е. Л. Согласованные системы и управление показателями Ляпунова // Дифференц. уравнения. – 1997. – Т. 33. – № 2. – С. 226–235.

⁷Култышев С. Ю., Тонков Е. Л. Управляемость линейной нестационарной системы // Дифференц. уравнения. – 1975. – Т. 11. – № 11. – С. 1206–1216.

В седьмом параграфе подробно исследовано свойство согласованности для стационарных систем. Показано, что для систем с наблюдателем нельзя обобщить результат работы В. М. Попова⁸ об эквивалентности свойств глобальной управляемости показателей Ляпунова стационарной системы (2) и вполне управляемости системы (1).

Восьмой параграф посвящен исследованию свойства глобальной управляемости показателей Ляпунова стационарных систем \mathbb{A} и \mathbb{B} . Пусть A — сопровождающая матрица для многочлена $\sigma(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_n$, т. е.

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{vmatrix}. \quad (11)$$

Построим по матрице A матрицу $G = \sum_{i=1}^n a_{i-1} J_{i-1}^* \in M_n$, $a_0 = 1$, где $J_p = \{\alpha_{ij}\}_{i,j=1}^n$, $\alpha_{i,i+p} = 1$, $i = 1, \dots, n-p$ и $\alpha_{ij} = 0$ при $j-i \neq p$, $p \in \{0, \dots, n-1\}$,

$$G = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & \dots & a_1 & 1 \end{vmatrix}. \quad (12)$$

Рассмотрим произвольную матрицу $D \in M_n$, имеющую блочный вид

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ F & 0 \end{vmatrix}, \quad (13)$$

где $F \in M_{n+1-k,k}$, $k \in \{1, \dots, n\}$.

Теорема 6. Пусть A имеет вид (11), D имеет вид (13) и $\chi(A + D, \lambda) = \lambda^n + \gamma_1\lambda^{n-1} + \dots + \gamma_n$ — характеристический многочлен матрицы $A + D$. Тогда $\gamma_i = a_i - \text{Sp } DJ_{i-1}G$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Отсюда вытекает теорема о глобальной управляемости показателей Ляпунова системы \mathbb{A} .

⁸Popov V. M. Hyperstabilitatea sistemelor automate. Editura Academiei Republicii Socialiste Romania. 1966. (Перевод с румынского: Попов В. М. Гиперустойчивость автоматических систем. – М.: Наука, 1970. – 456 с.)

Теорема 7. Пусть A имеет вид (11) и $C^*e_i e_j^* B = 0$ для всех $1 \leq j < i \leq n$. Тогда система $\mathbb{A} = (A, B, C)$ обладает свойством глобальной управляемости показателей Ляпунова в том и только том случае, если матрицы $C^* J_{i-1} G B$, $i = 1, \dots, n$ линейно независимы.

Для системы $\mathbb{B} = (A_0, A_1, \dots, A_r)$ теорема о глобальной управляемости показателей Ляпунова формулируется следующим образом. Пусть A_0 имеет вид (11). Построим по матрице A_0 матрицу G . Далее построим матрицы

$$Q = [\text{vec } J_0^*, \text{vec } J_1^*, \dots, \text{vec } J_{n-1}^*] \in M_{n^2, n}, \quad P = G \otimes I^n \in M_{n^2},$$

$$R = [\text{vec } A_1, \dots, \text{vec } A_r] \in M_{n^2, r}, \quad S = Q^* P R \in M_{n, r}.$$

Теорема 8. Пусть A_0 имеет вид (11) и для некоторого $k \in \{1, \dots, n\}$ все матрицы A_l , $l = 1, \dots, r$ имеют вид (13). Тогда система \mathbb{B} обладает свойством глобальной управляемости показателей Ляпунова в том и только том случае, если $\text{rank } S = n$.

В девятом параграфе рассматривается линейное управляемое стационарное уравнение n -го порядка с наблюдателем

$$\begin{aligned} z^{(n)} + a_1 z^{(n-1)} + a_2 z^{(n-2)} + \dots + a_n z = \\ = \beta_{p1} v_1^{(n-p)} + \beta_{p+1,1} v_1^{(n-p-1)} + \dots + \beta_{n1} v_1 + \dots \\ + \beta_{pm} v_m^{(n-p)} + \dots + \beta_{nm} v_m, \quad z \in \mathbb{R}, \quad 1 \leq p \leq n, \end{aligned} \quad (14)$$

$$\begin{aligned} y_1 &= c_{11} z + \dots + c_{p1} z^{(p-1)}, \\ \dots &\dots \\ y_k &= c_{1k} z + \dots + c_{pk} z^{(p-1)}, \end{aligned} \quad (15)$$

$v = (v_1, \dots, v_m) \in \mathbb{R}^m$ — вектор управления, $y = (y_1, \dots, y_k) \in \mathbb{R}^k$ — вектор наблюдения. Управление строится в виде $v = Vy$. По системе (14), (15) построим матрицы $A \in M_n$ вида (11), $G \in M_n$ вида (12) и матрицы $K \in M_{n,m}$, $C \in M_{n,k}$:

$$K = \begin{vmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \\ \beta_{p1} & \dots & \beta_{pm} \\ \vdots & & \vdots \\ \beta_{n1} & \dots & \beta_{nm} \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} c_{11} & \dots & c_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{p1} & \dots & c_{pk} \\ 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Показано, что уравнение с наблюдателем (14), (15) эквивалентно стационарной управляемой матричной системе с наблюдателем

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = C^*x, \quad (x, y, u) \in \mathbb{R}^{n+k+m}, \quad (16)$$

где $B = G^{-1}K$. Для системы (16) выполнены условия теоремы 7 о глобальной управляемости показателей. Отсюда получены условия приводимости уравнения с наблюдателем (14), (15) к наперед заданному линейному стационарному уравнению.

Теорема 9. *Линейная независимость матриц $C^*J_{i-1}K$, $i = 1, \dots, n$ является необходимым и достаточным условием того, что для любого $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n) \in \mathbb{R}^n$ находится матрица $V \in M_{m,k}$ такая, что замкнутая управлением $v = Vy$ система (14), (15) имеет вид*

$$z^{(n)} + \gamma_1 z^{(n-1)} + \dots + \gamma_n z = 0.$$

Искомое управление выражается формулой

$$V = [\text{vec}^{-1}(P(P^*P)^{-1}(a - \gamma))]^*,$$

где $P = [\text{vec } C^*J_0K, \dots, \text{vec } C^*J_{n-1}K] \in M_{mk,n}$, $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$.

В десятом параграфе изучается линейная система (1).

Определение 3. Система (1) называется λ -приводимой, если для любого $\lambda \in \mathbb{R}$ существует ограниченное кусочно непрерывное управление $U_\lambda = U_\lambda(t)$, при котором замкнутая система $\dot{x} = (A(t) + B(t)U_\lambda(t))x$ асимптотически эквивалентна системе $\dot{x} = (A(t) + \lambda I)x$.

Теорема 10. *Если система (1) равномерно вполне управляема, то она λ -приводима.*

Эта теорема была сформулирована и доказана в работе Е. К. Макарова и С. Н. Поповой⁹ в предположении, что функция $A(\cdot)$ непрерывна, а $B(\cdot)$ равномерно непрерывна на \mathbb{R} . Здесь приведено более простое доказательство этой теоремы для произвольных ограниченных кусочно непрерывных матриц $A(\cdot)$, $B(\cdot)$.

Следствие 1. *Если система (1) равномерно вполне управляема, то для любого $\lambda \in \mathbb{R}$ найдется такое управление $U = U(t)$, что показатели Ляпунова замкнутой системы удовлетворяют равенствам $\lambda_j(A + BU) = \lambda_j(A) + \lambda$ при всех $j \in \{1, \dots, n\}$.*

⁹ Макаров Е. К., Попова С. Н. О глобальной управляемости центральных показателей линейных систем // Изв. ВУЗов. Матем. – 1999. – № 2 (441).– С. 60–67.

Следствие 2. Если система (1) равномерно вполне управляема, то она обладает свойством глобальной управляемости верхнего центрального показателя¹⁰, т. е. для любого $\mu \in \mathbb{R}$ найдется такое управление $U = U(t)$, что верхний центральный показатель $\Omega(A+BU)$ замкнутой системы удовлетворяет равенству $\Omega(A+BU) = \mu$.

В случае равномерной полной управляемости системы (1) свойством глобальной управляемости обладают нижний центральный ω , а также верхний Ω^0 и нижний ω_0 особые показатели. Результаты этого параграфа уточняют соответствующие результаты работы Е. Л. Тонкова¹¹, в которой показано, что для любого $\alpha > 0$ найдется управление $U = U(t)$, такое что верхний особый показатель замкнутой системы удовлетворяет неравенству $\Omega^0(A+BU) < -\alpha$ (в действительности этот показатель можно точно переместить в заданную точку).

В одиннадцатом параграфе доказана теорема о глобальной управляемости показателей Ляпунова системы (1) с кусочно постоянными матрицами для $n = 2$, и описана идея доказательства этой теоремы для произвольного n .

Пусть фиксировано разбиение $\mathbb{T} = \{t_i\}_{i=0}^\infty$ множества $\mathbb{R}_+ = [0, \infty)$, такое что $t_0 = 0$, $0 < \delta \leq t_i - t_{i-1} \leq L$ для некоторых δ, L и всех $i \in \mathbb{N}$. Обозначим $\Delta_i = [t_{i-1}, t_i]$. Пусть задан конечный набор символов (или букв) σ_j , $j = 1, \dots, N$, где символ — это пара матриц $\sigma_j = (A_j, B_j) \in M_n \times M_{n,m}$. Множество $\Sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_N\}$ назовем алфавитом. Рассмотрим бесконечную последовательность букв — слово $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots)$, $\varphi_i \in \Sigma$, т. е. $\varphi_i = \sigma_{j_i}$, $j_i \in \{1, \dots, N\}$. Конечный набор $(\varphi_{i_0+1}, \dots, \varphi_{i_0+k})$ из k последовательно расположенных букв слова φ назовем слогом длины k . Будем предполагать, что существуют буква σ_{j_0} и число $r \in \mathbb{N}$, такие что в каждом слоге длины r встречается буква σ_{j_0} . Слово φ и разбиение \mathbb{T} задают функцию $t \rightarrow \varphi(t) = (A(t)B(t))$, $t \in \mathbb{R}_+$, где $\varphi(t) = \varphi_i$, $t \in \Delta_i$, $i \in \mathbb{N}$. Таким образом, функция $t \rightarrow \varphi(t)$ определяет систему

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u, \quad t \in \mathbb{R}_+, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad u \in \mathbb{R}^m \quad (17)$$

с матрицами коэффициентов, которые принимают постоянные значения (A_{j_i}, B_{j_i}) на промежутках $[t_{i-1}, t_i]$. Систему (17) с кусочно постоянными матрицами коэффициентов будем отождествлять со словом φ

¹⁰ Былов Б. Ф., Виноград Р. Э., Гробман Д. М., Немышкий В. В. Теория показателей Ляпунова. — М.: Наука, 1966. — 576 с.

¹¹ Тонков Е. Л. Критерий равномерной управляемости и стабилизация линейной рекуррентной системы // Дифференц. уравнения. — 1979. — Т. 15. — № 10. — С. 1804–1813.

(зависимость от разбиения \mathbb{T} подчеркивать не будем, поскольку \mathbb{T} фиксировано). Будем предполагать, что каждая пара $(A_j, B_j) \in \Sigma$ вполне управляема, т. е. $\text{rank}(B_j, A_j B_j, \dots, A_j^{n-1} B_j) = n$ для всех $j = 1, \dots, N$.

Определение 4. Система φ обладает свойством глобальной управляемости показателей Ляпунова, если для любых $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ найдется ограниченная кусочно непрерывная функция $U : \mathbb{R}_+ \rightarrow M_{m,n}$, такая что показатели Ляпунова замкнутой системы

$$\dot{x} = (A(t) + B(t)U(t))x \quad (18)$$

совпадают с числами $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Теорема 11. Пусть $n = 2$. Для любых $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ найдется такое управление $U = U(t)$, что система (18) асимптотически эквивалентна системе $\dot{y} = \Lambda y$, где $\Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2\}$.

Доказательство этой теоремы опирается на следующее утверждение, представляющее самостоятельный интерес.

Теорема 12. Пусть

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots \dots \dots & 0 \end{vmatrix}, \quad b = \begin{vmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}.$$

Для любых чисел $\alpha_1, \dots, \alpha_n > 0$ и для любого $T > 0$ найдется ограниченное кусочно непрерывное управление $V : [0, T] \rightarrow M_{1,n}$, такое что для матрицы Коши $X_V(t, s)$ системы $\dot{x} = (A + bV(t))x$ выполнено равенство

$$X_V(T, 0) = \text{diag}\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}. \quad (19)$$

Показано, что для построения управления, обеспечивающего равенство (19) необходимо и достаточно построить функции $g_1, \dots, g_n \in KC^n([0, T], \mathbb{R})$, так чтобы матрица Вронского $W[g_1, \dots, g_n](t)$ для этих функций удовлетворяла соотношениям

$$W[g_1, \dots, g_n](0) = I, \quad W[g_1, \dots, g_n](T) = \text{diag}\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\},$$

$$\det W[g_1, \dots, g_n](t) \geq \gamma > 0, \quad t \in [0, T].$$

В диссертации такие функции построены для $n = 2$.

Резюме. В работе доказаны:

- а) теорема о локальной ляпуновской приводимости билинейной управляемой системы и вытекающие из нее следствия о локальной управляемости показателей Ляпунова;
- б) теорема о глобальной управляемости показателей Ляпунова стационарной системы с наблюдателем;
- в) теорема о λ -приводимости линейной управляемой системы и вытекающие из нее следствия о глобальной управляемости центральных и особых показателей;
- г) теорема о глобальной управляемости показателей Ляпунова двумерных кусочно постоянных систем.

Публикация основных результатов

1. Зайцев В.А. Достигимость и локальная управляемость показателей Ляпунова систем со случайными параметрами // Изв. Ин-та матем. и информ. УдГУ. – Ижевск, 1998. – Вып. 2(13). – С. 71–88.
2. Zaitsev V.A. On Controllability of Ergodic System Lyapunov Exponents // Nonsmooth and Discontinuous Problems of Control and Optimization / A Proceedeengs volume from the IFAC Workshop (Chelyabinsk, Russia, 17–20 June 1998). – 1999. – Р. 223–226.
3. Зайцев В.А., Тонков Е.Л. Достигимость, согласованность и метод поворотов В.М. Миллионщикова // Изв. ВУЗов. Математика. – 1999. – № 2 (441). – С. 45–56.
4. Зайцев В.А. Управление показателями Ляпунова стационарных систем с наблюдателем // Тезисы докладов четвертой Российской университетско-академической научно-практической конференции. — Ижевск, 23–24 апреля 1999 г. – С. 33.
5. Зайцев В.А. Согласованность и управление показателями Ляпунова // Изв. Ин-та матем. и информ. УдГУ. – Ижевск, 1999. – Вып. 2(17). – С. 3–40.
6. Зайцев В.А. Об управлении показателями Ляпунова и о λ -приводимости // Вестник Удмуртского университета. – Ижевск, 2000. – № 1. – С. 35–44.